



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 2950 от « 23 » декабря 2020 г.

Настоящее свидетельство выдано

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «АЛЬБИТ», ОГРН 1025007774285

(наименование регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты +
29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого

(наименование пестицида или агрохимиката)

двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида)

получил государственную регистрацию за № 081-02-2950-1

на срок по « 22 » декабря 2030 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.



№003338

Для сельскохозяйственного производства:

Норма расхода препарата, л/т, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,04	Пшеница озимая, яровая	Корневые гнили	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)
		Ржавчина бурая, мучнистая роса, септориоз (при слабом развитии болезней)	Опрыскивание в период вегетации в фазах: кущение – выход в трубку и колошение – цветение. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	-(2)
	Ячмень яровой	Корневые гнили	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)
		Пятнистости: сетчатая и темно-бурая (при слабом развитии болезни)	Опрыскивание в период вегетации в фазах: кущение – выход в трубку и колошение. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	-(2)
0,05-0,07	Лен-долгунец	Антракноз, крапчатость, бактериоз	Предпосевная обработка семян с добавлением NaKMn (0,2 кг/т). Расход рабочей жидкости – 5 л/т	-(1)
0,05		Антракноз, пасмо	Опрыскивание в период вегетации в фазу «елочки». Расход рабочей жидкости – 200 л/га	-(1)
0,1	Картофель	Ризоктониоз, фитофтороз (при слабом развитии болезней)	Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)
0,05		Фитофтороз, альтернариоз (при слабом развитии болезней)	Опрыскивание в период вегетации в фазах смыкания рядков – бутонизация, последующее – через 10-15 дней. Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га	-(2)
0,1	Свекла сахарная	Корнеед всходов	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 15 л/т	-(1)



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 23 декабря 2020 г. № 2950

1	2	3	4	5
0,25	Виноград	Оидиум (при слабом развитии болезни)	Опрыскивание в системе с другими фунгицидами в фазы: перед цветением, в начале формирования ягод (ягода размером с крупинку), смыкание ягод в грозди, окрашивание ягод. Расход рабочей жидкости — 800-1000 л/га	-(4)
1 мл/кг семян	Капуста белокочанная	Сосудистый бактериоз	Предпосевное замачивание семян в 0,1%-й суспензии препарата в течение 3 часов. Расход рабочей жидкости — 1 л/кг семян	-(1)
0,04-0,06			Опрыскивание в фазе 3-5 настоящих листьев, последующие с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости — 400 л/га	-(2-3)

Для личных подсобных хозяйств:

Норма расхода препарата	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
3 мл/10 л воды	Виноград	Оидиум (при слабом развитии болезни)	Опрыскивание в период вегетации в фазы: перед цветением, в начале формирования ягод (ягода размером с крупинку), смыкание ягод в грозди, окрашивание ягод. Расход рабочей жидкости — 10 л/100 м ²	-(4)

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 2 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 23 декабря 2020 г. № 2950

1	2	3	4	5
10 мл/л воды	Картофель	Ризоктониоз, фитофтороз (при слабом развитии болезней)	Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей жидкости – 1 л на 100 кг клубней	-(1)
1 мл/10 л воды		Фитофтороз, альтернариоз (при слабом развитии болезней)	Опрыскивание в период вегетации в фазах смыкания рядков – бутонизация, последующее – через 10-15 дней. Расход рабочей жидкости – 5 л/100 м ²	-(2)
1 мл/1 л воды	Капуста белокочанная	Сосудистый бактериоз	Предпосевное замачивание семян в течение 3 часов. Расход рабочей жидкости – 100 мл/100 г семян	-(1)
1 мл/10 л воды			Опрыскивание в фазе 3-5 настоящих листьев, последующие с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости – 5 л/100 м ²	-(2-3)

Сроки безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных и ручных работ – не регламентируются.

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

