МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 866 от «26» ноября 2015 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «НПФ «АЛЬБИТ», ОГРН 1025007774285

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двухзамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 081-07-866-1

на срок по «25» ноября 2025 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, химизации

и защиты растений П.А.Чекмарев

(подпись)

М. П.

№000974

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2013 г. Уровень «Б».

Для сельскохозяйственного производства:

Культуры	Норма расхода препарата	Назначение	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания, (кратность обработок)
1	2	3	4	5
Пшеница яровая	100 мл/т	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразователь-ных процессов, повышение устойчивости к засухе и другим неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции (увеличение содержания клейковины)	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости -10 л/т	- (1)
	30-40 мл/га (А)		Опрыскивание: 1-ое – в фазе кущение – выход в трубку, 2–ое – в фазе колошения – цветения. Расход рабочей жидкости: наземные опрыскиватели – 200-300 л/га, авиационные опрыскиватели – 50-100 л/га	- (1-2)
Пшеница озимая	30-40 мл/т	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовате-льных процессов, повышение устойчивости к засухе и другим к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции (увеличение содержания клейковины)	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости -10 л/т	- (1)
	30-40 мл/га (А)		Опрыскивание растений: 1-ое – в фазе кущение – выход в трубку, 2–ое – в фазе колошения – цветения. Расход рабочей жидкости: наземные опрыскиватели – 200-300 л/га, авиационные опрыскиватели – 50-100 л/га	- (1-2)

Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 26.11.2015 № 866

1	2	3	4	5
Ячмень яровой, ячмень озимый	30-40 мл/т	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразователь-ных процессов, повышение устойчивости к засухе и другим неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, снижение стресса после обработки гербицидами, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	- (1)
	30-40 мл/га (А)		Опрыскивание растений: 1-ое - в фазе кущение – выход в трубку, 2–ое – в фазе колошения – цветения. Расход рабочей жидкости: наземные опрыскиватели – 200-300 л/га, авиационные опрыскиватели – 50-100 л/га	- (1-2)
Ячмень яровой, ячмень озимый (пивоварен-ные сорта)	30-40 мл/т	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к засухе и другим неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, снижение стресса после обработки гербицидами, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	- (1)
	30-40 мл/га (А)		Опрыскивание в фазе кущение – выход в трубку, расход: наземные опрыскиватели – 200-300 л/га, авиационные опрыскиватели – 50-100 л/га	

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

Приложение № 2 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 26.11.2015 № 866

1	2	3	4	5
Тритикале озимое, тритикале яровое	50 мл/т	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	- (1)
	30-50 мл/га		Опрыскивание растений в фазе кущения. Расход рабочей жидкости – 200 л/га	
Рожь	50 мл/т	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразователь-ных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	
	20 мл/га		Опрыскивание растений в фазе кущения. Расход рабочей жидкости – 200 л/га	

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

Приложение № 3 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 26.11.2015 № 866

1	2	3	4	5
Рис	50 мл/т	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразователь-ных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 15 л/т	-(1)
Овёс	20 мл/т	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразователь-ных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции, снижение содержания микотоксинов в урожае	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	
	20 мл/га		Опрыскивание растений в фазе кущения. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

Приложение № 4 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 26.11.2015 № 866

1	2	3	4	5
Кукуруза	100 мл/т	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	- (1)
	40 мл/га		Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 3-6 листьев, 2-е – в фазе цветения. Расход рабочей жидкости - – 300 л/га	- (2)
Гречиха	50 мл/т	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 15 л/т	- (1)
Просо	50 мл/т	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 20 л/т	
	30 мл/га		Опрыскивание растений в фазе кущения. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

Приложение № 5 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 26.11.2015 № 866

1	2	3	4	5
Сорго	80 мл/т	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 20 л/т	- (1)
	80 мл/га		Опрыскивание растений в фазе 3-5 листьев. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	
Подсолнечник	200 мл/т	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 50 л/т	
	40 мл/га		Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 4-7 листьев, 2-е – в фазе цветения. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	- (1-2)

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

Приложение № 6 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 26.11.2015 № 866

1	2	3	4	5
Соя	50 мл/т	Повышение полевой всхожести, увеличение количества азотфиксирующих клубеньков, активизация ростовых и формообразователь-ных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, снижение стресса после обработки гербицидами, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 15 л/т	- (1)
	40-50 мл/га		Опрыскивание растений в фазе бутонизации (или в фазе 2-3 листьев). Расход рабочей жидкости – 300 л/га	
Лён-долгунец	50-100 мл/т	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразователь-ных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, снижение стресса после обработки гербицидами, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 15 л/т	
	50 мл/га		Опрыскивание растений в фазе «ёлочки». Расход рабочей жидкости – 300 л/га	

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

Приложение № 7 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 26.11.2015 № 866

1	2	3	4	5
Лён масличный	50-100 мл/т	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразователь-ных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, снижение стресса после обработки гербицидами, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 15 л/т	-(1)
	100 мл/га		Опрыскивание растений в фазе «ёлочки». Расход рабочей жидкости – 300 л/га	
Бобы кормовые	50 мл/т	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразователь-ных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 15 л/т	
	30 мл/га		Опрыскивание растений в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П. А. Чекмарев

Приложение № 8 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 26.11.2015 № 866

1	2	3	4	5
Фасоль	50 мл/т	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразователь-ных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 15 л/т	- (1)
	30 мл/га		Опрыскивание растений в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	
Горох	50 мл/т	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразователь-ных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 15 л/т	
	30 мл/га		Опрыскивание растений в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

Приложение № 9 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 26.11.2015 № 866

1	2	3	4	5
Нут	30-50 мл/т	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразователь-ных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	- (1)
	30 мл/га		Опрыскивание растений в фазе 4-5 листьев. Расход рабочей жидкости – 200 л/га	
Чечевица	50 мл/т	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразователь-ных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10-15 л/т	
	30 мл/га		Опрыскивание растений в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

Приложение № 10 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 26.11.2015 № 866

1	2	3	4	5
Свекла сахарная	30-40 мл/га	Активизация ростовых и формообразователь-ных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, снижение стресса после обработки гербицидами, повышение урожайности, повышение сахаристости корнеплодов	Опрыскивание растений в период с фазы 5-6 пар листьев до фазы смыкания рядков с интервалом 10-20 дней. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	- (1-2)
Карто-фель	100 мл/т	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразователь-ных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, увеличение выхода товарных клубней, улучшение качества продукции	Обработка клубн перед посадкой. Расх рабочей жидкос – 10 л/т	- (1)
	50 мл/га		Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е – через 10-15 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га	- (2)

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

Приложение № 11 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 26.11.2015 № 866

1	2	3	4	5
Рапс	50-60 мл/т	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразователь-ных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, снижение стресса после обработки гербицидами и инсектицидами, повышение урожайности, увеличение масличности семян, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	- (1)
	50-60 мл/га		Опрыскивание растений: 1-е – в фазе стеблевания, 2-е - в фазе бутонизации-начало цветения. Расход рабочей жидкости – 200 л/га	- (2)

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

Приложение № 12 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 26.11.2015 № 866

1	2	3	4	5
Свекла столовая	30 мл/га	Активизация ростовых и формообразователь-ных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе смыкания ботвы в рядках, 2-е - через 3 недели после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	-(2)
Томат (открытый и защи-щенный грунт)	2 мл/кг	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразователь-ных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение ранней и общей урожайности, увеличение содержания в плодах витаминов, снижение содержания нитратов, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 3 часа. Расход рабочей жидкости – 1 л/кг	- (1)
	30 мл/га		Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	- (2)

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

Приложение № 13 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 26.11.2015 № 866

1	2	3	4	5
Огурец (открытый и защищенный грунт)	2 мл/кг	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение ранней и общей урожайности, снижение содержания нитратов в плодах, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 3 часа. Расход рабочей жидкости – 1 л/кг	- (1)
	30 мл/га		Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания (перед высадкой рассады в грунт). Расход рабочей жидкости – 300 л/га	- (2)
Перец сладкий	2 мл/кг	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение ранней и общей урожайности, увеличение содержания в плодах витаминов, снижение содержания нитратов, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 3 часа. Расход рабочей жидкости – 1 л/кг	- (1)
	30 мл/га		Опрыскивание: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	- (2)
Баклажан	2 мл/кг	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 3 часа. Расход рабочей жидкости – 1 л/кг	- (1)
	30 мл/га		Опрыскивание: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 400 л/га	- (2)

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

Приложение № 14 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 26.11.2015 № 866

1	2	3	4	5
Кабачок	2 мл/кг	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 3 часа. Расход рабочей жидкости – 1 л/кг	- (1)
	30 мл/га		Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 400 л/га	- (2)
Капуста бело-кочан-ная	1 мл/кг	Повышение полевой всхожести, улучшение качества рассады, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 3 часа. Расход рабочей жидкости – 1 л/кг	- (1)
	40 мл/га		Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 3-5 листьев, 2-е и 3е – с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости – 400 л/га	- (3)
Морковь	2 мл/кг	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 3 часа. Расход рабочей жидкости – 1 л/кг	- (1)
	30 мл/га		Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е – через 15 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	- (2)

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

Приложение № 15 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 26.11.2015 № 866

1	2	3	4	5
Лук репчатый (на перо) (открытый и защищенный грунт)	5-10 мл/кг	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, увеличение содержания витаминов, снижение содержания нитратов, улучшение качества продукции	Замачивание луковиц перед посадкой на 1 час. Расход рабочей жидкости– 1 л/кг	- (1)
Салат	2 мл/кг	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение ранней и общей урожайности, увеличение содержания витаминов, снижение содержания нитратов, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 3 часа. Расход рабочей жидкости – 1 л/кг	
	30 мл/га		Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е – через 15 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	- (2)
Капуста пекинская	1 мл/кг	Повышение полевой всхожести, улучшение качества рассады, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 3 часа. Расход рабочей жидкости – 1 л/кг	- (1)
	40 мл/га		Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 3-5 листьев, 2-е и 3-е – с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	- (3)

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

Приложение № 16 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 26.11.2015 № 866

1	2	3	4	5
Клевер	40 мл/га	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, усиление отрастания после скашивания, увеличение количества соцветий, ускорение прохождения фаз развития, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности зеленой массы, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в начале возобновления вегетации (после перезимовки), 2-е – в фазе стеблевания – начала бутонизации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	- (2)
Козлятник (галега восточная)	70 мл/т	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, усиление отрастания после скашивания, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности зеленой массы, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 15 л/т	- (1)
	40 мл/га		Опрыскивание растений в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га	- (1)
Люпин	50 мл/т	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 15 л/т	- (1)
	30 мл/га		Опрыскивание растений в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

Приложение № 17 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 26.11.2015 № 866

1	2	3	4	5
Люцерна	50 мл/т	Повышение полевой всхожести, усиление отрастания после скашивания, увеличение количества соцветий, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности зеленой массы и семян, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 15 л/т	- (1)
	40 мл/га		Опрыскивание растений: 1-е – в начале возобновления вегетации (после перезимовки). Расход рабочей жидкости – 300 л/га	
	70 мл/га		Опрыскивание растений: через 7 дней после каждого скашивания травостоя. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	- (2-3)
Виноград	200-250 мл/га	Повышение завязываемости ягод, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, активизация восстановления ослабленных и поврежденных растений, увеличение выполненности и массы грозди, числа вызревших ягод в грозди, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е – после цветения, 3-е – в фазе начала роста ягод, 4-е – в фазе смыкания ягод в грозди, 5-е – в фазе окрашивания ягод. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га	- (5)
Яблоня	100 мл/га	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, увеличение массы плода, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе выдвижения соцветий - розовый бутон, 2-е – после цветения, 3-е – через две недели после второго опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га	- (3)

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

Приложение № 18 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 26.11.2015 № 866

1	2	3	4	5
Мандарин	250 мл/га	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к засухе, низким температурам и другим неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, снижение стрессового действия и повышение эффективности химических пестицидов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в конце фазы цветения, 2-е – в период формирования плодов, 3-е – за месяц до сбора урожая. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га	- (3)
Вишня	100 мл/га	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е и 3-е – с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га	

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

Приложение № 19 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 26.11.2015 № 866

1	2	3	4	5
Хурма	250 мл/га	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к засухе, низким температурам и другим неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в конце фазы цветения, 2-е – после цветения, 3-е – в фазе созревания плодов. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га	- (3)
Персик	250 мл/га	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к засухе, низким температурам и другим неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в конце фазы цветения, 2-е – в период листообразования и роста побегов, 3-е – в период формирования плодов, 4-е – за 2 недели до сбора урожая. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	- (3-4)

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

Приложение № 20 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 26.11.2015 № 866

1	2	3	4	5
Крыжовник	50 мл/га	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е и 3-е – с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости – 600 л/га	- (3)
Смородина черная	50 мл/га	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение завязываемости ягод, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е и 3-е – с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости – 600 л/га	
Земляника	40 мл/га	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е и 3-е – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 400 л/га	

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

Приложение № 21 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 26.11.2015 № 866

1	2	3	4	5
Травы газонные	60 мл/га	Активизация ростовых процессов, усиление отрастания после перезимовки и скашивания, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды	Опрыскивание растений: 1-е – в начале возобновления вегетации (после перезимовки), 2-е – после скашивания травостоя. Расход рабочей жидкости – 600 л/га	- (1-2)
Декоративные культуры (деревья и кустарники)	70-100 мл/га	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание растений: 1-е – в период возобновления вегетации (весной), 2-е и 3-е – с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости – 700 л/га	- (2-3)
Цветочные культуры (открытый и защищенный грунт)	70 мл/га	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, увеличение продолжительности цветения, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 700 л/га	- (2)
Декоративные культуры (деревья и кустарники), лесные культуры	1 мл/л воды	Улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды	Замачивание черенков перед посадкой на 3-5 часов. Расход рабочей жидкости – 1-10 л/50 черенков	- (1)

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

Приложение № 22 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 26.11.2015 № 866

Для личных подсобных хозяйств:

Культуры	Норма расхода препарата	Назначение	Сроки, способ обработки. Норма расхода рабочей жидкости л/га, л/т	Срок ожидания, (кратность обработок)
1	2	3	4	5
Картофель	10 мл/л воды	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, увеличение выхода товарных клубней, улучшение качества продукции	Обработка клубней перед посадкой. Расход рабочей жидкости – 1 л/100 кг	- (1)
	2 мл/10 л воды		Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е – через 10-15 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 $м^2$	- (2)
Свекла столовая	1 мл/10 л воды	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе смыкания ботвы в рядках, 2-е - через 3 недели после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 $м^2$	

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

Приложение № 23 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 26.11.2015 № 866

1	2	3	4	5
Томат (открытый и защищен-ный грунт)	2 мл/л воды	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразователь-ных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение ранней и общей урожайности, увеличение содержания в плодах витаминов, снижение содержания нитратов, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 3 часа. Расход рабочей жидкости – 100 мл/100 г	- (1)
	1 мл/10 л воды		Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 $м^2$	- (2)
Огурец (открытый и защищен-ный грунт)	2 мл/ л воды	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразователь-ных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение ранней и общей урожайности, снижения содержания нитратов в плодах, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 3 часа. Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	- (1)
	1 мл/10 л воды		Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания (перед высадкой рассады в грунт). Расход рабочей жидкости – 3 л/100 $м^2$	- (2)

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

Приложение № 24 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 26.11.2015 № 866

1	2	3	4	5
Перец сладкий	2 мл/л воды	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразователь-ных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение ранней и общей урожайности, увеличение содержания в плодах витаминов, снижение содержания нитратов, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 3 часа. Расход рабочей жидкости – 100 мл/100 г	- (1)
	1 мл/10 л воды		Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 $м^2$	- (2)
Баклажан	2 мл/л воды	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразователь-ных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 3 часа. Расход рабочей жидкости – 100 мл/100 г	- (1)
	1 мл/10 л воды		Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 $м^2$	- (2)

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

Приложение № 25 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 26.11.2015 № 866

1	2	3	4	5
Кабачок	2 мл/л воды	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 3 часа. Расход рабочей жидкости – 100 мл/100 г	- (1)
	1 мл/10 л воды		Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 3 л/ 100 $м^2$	- (2)
Капуста белокочан-ная	1 мл/л воды	Повышение полевой всхожести, улучшение качества рассады, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 3 часа. Расход рабочей жидкости – 100 мл/100 г	- (1)
	1 мл/10 л воды		Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 3-5 листьев, 2-е и 3е – с интервалом 2 недели. Расход рабочей жидкости – 4 л/100 $м^2$	- (3)
Морковь	2 мл/л воды	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 3 часа. Расход рабочей жидкости – 100 мл/100 г	- (1)
	1 мл/10 л воды		Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е – через 15 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 $м^2$	- (2)

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

Приложение № 26 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 26.11.2015 № 866

1	2	3	4	5
Лук репчатый (на перо) (открытый и защищен-ный грунт)	5-10 мл/л воды	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, увеличение содержания витаминов, снижение содержания нитратов, улучшение качества продукции	Замачивание луковиц перед посадкой на 1 час. Расход рабочей жидкости – 1 л/кг	- (1)
Салат (открытый и защищен-ный грунт)	2 мл/л воды	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение ранней и общей урожайности, увеличение содержания витаминов, снижение содержания нитратов, улучшение качества продукции	Замачивание семян перед посевом на 3 часа. Расход рабочей жидкости – 100 мл/100 г	- (1)
	1 мл/10 л воды		Опрыскивание растений: 1-е – в фазе 2-3 листьев, 2-е – через 15 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м^2	- (2)

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

Приложение № 27 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 26.11.2015 № 866

1	2	3	4	5
Виноград	3 мл/10 л воды	Повышение завязываемости ягод, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, активизация восстановления ослабленных и поврежденных растений, увеличение выполненности и массы грозди, числа вызревших ягод в грозди, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е – после цветения, 3-е – в фазе начала роста ягод, 4-е – в фазе смыкания ягод в грозди, 5-е – в фазе окрашивания ягод. Расход рабочей жидкости – 10 л/ 100 $м^2$	- (5)
Яблоня	1 мл/10 л воды	Активизация ростовых и формообразователь-ных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, увеличение массы плода, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе выдвижения соцветий - розовый бутон, 2-е – после цветения, 3-е – через две недели после второго опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 5 л/дерево	- (3)

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

Приложение № 28 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 26.11.2015 № 866

1	2	3	4	5
Вишня	1 мл/10 л воды	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е и 3-е – с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости – 2,5-5 л/дерево	- (3)
Крыжовник	1 мл/ 10 л воды	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е и 3-е – с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости – 1-2,5 л/куст	- (3)
Смородина черная	1 мл/ 10 л воды	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение завязываемости ягод, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е и 3-е – с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости – 1-2,5 л/ куст	- (3)

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

Приложение № 29 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 26.11.2015 № 866

1	2	3	4	5
Земляника	1 мл/10 л воды	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е и 3-е – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 4 л/100 $м^2$	- (3)
Травы газонные	1 мл/10 л воды	Активизация ростовых процессов, усиление отрастания после перезимовки и скашивания, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды	Опрыскивание растений: 1-е – в начале возобновления вегетации (после перезимовки), 2-е – после скашивания травостоя. Расход рабочей жидкости – 6 л/100 $м^2$	- (1-2)
Декоратив-ные культуры (деревья и кустарники)	1 мл/10 л воды	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание растений: 1-е – в период возобновления вегетации (весной), 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 1-10 л/растение	- (2)
Цветочные культуры (открытый и защищен-ный грунт)	1 мл/10 л воды	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, к поражению болезнями, увеличение продолжительности цветения, улучшение декоративных качеств	Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е - через 15 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 7 л/100 $м^2$	- (2)

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

Приложение № 30 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Альбит, ТПС (6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляной кислоты + 29,8 г/кг магния сернокислого + 91,1 г/кг калия фосфорнокислого двузамещенного + 91,2 г/кг калия азотнокислого + 181,5 г/кг карбамида) от 26.11.2015 № 866

1	2	3	4	5
Плодово-ягодные, декоратив-ные культуры (деревья и кустарники), лесные культуры	1 мл/л воды	Улучшение приживаемости, активизация ростовых процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды	Замачивание черенков перед посадкой на 3-5 часов. Расход рабочей жидкости – 0,1-1 л/ 5 черенков	- (1)

Сроки выхода для ручных и механизированных работ не регламентируются.

Запрещается применение препарата в водоохранной зоне водных объектов.

Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев